

童医院门诊处方进行了调查,现报告如下 fi

fi 材料与amp;方法

从医院计算机信息系统中调出 年 月至
月重庆医科大学附属儿童医院门诊处方

出生后肠道结构和功能发育的差异,疾病状态下菌群紊乱程度和方式可能存在不同,因此医生在选择用药时还应该注意个体化和及时调整益生菌种类。

益生菌制剂用于肠道疾病最多,呼吸道疾病次之,新生儿黄疸和过敏性疾病也有使用益生菌制剂。目前儿科临床应用:①小儿腹泻病。腹泻是儿科常见的消化系统疾病,病因复杂,一般分为感染性(抗生素相关性)及各种原因导致的菌群失调性腹泻。益生菌制剂通过增加腹泻者肠道内有益菌的数量和活力,抑制致病菌的生长,以恢复正常的菌群平衡,达到缓解腹泻症状效果。②功能性胃肠道疾病。功能性胃肠道疾病病因不明确,可能与肠道运动功能失调、内脏敏感性增高、黏膜免疫炎症、中枢和肠神经轴调节异常、肠道菌群紊乱有关。

合使用。如必须同时应用时应选用针对病原菌的高效窄谱抗生素，且应用最小的有效治疗量，并错开服药时间，最好间隔 2 小时以上，或加大益生菌剂量。或选用一些死菌及其代谢产物制剂。对全身或肠道以外的感染最好避免使用口服抗生素。布拉氏酵母菌、酪酸菌和芽胞杆菌制剂对抗生素不敏感，可以与抗生